

L'**Orchidarium** de Prangins vous propose une large gamme d'orchidées exotiques originales.

Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd'hui de leur magnifique floraison. Dans un environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et refleuriront.

Phalaenopsis

hybride

ASIE du SUD EST

| facile | floraison 2 mois | intérieur lumineux | 15-25°C | arrosage 1x/sem

Emplacement

Derrière une fenêtre lumineuse.
Température idéale 15-25°C.
Eviter les courants d'air, le soleil direct et les zones sombres.

Arrosage

Généreux, une fois par semaine.
Utiliser une eau tempérée, si possible sans calcaire (Volvic, eau de pluie, filtre Brita ou eau de renouvellement de votre aquarium d'eau douce).

Si le Phalaenopsis est planté dans de la mousse de sphaigne au lieu de l'écorce, arroser 2x par mois seulement car la mousse reste humide plus longtemps.

Ne jamais laisser la plante les pieds dans l'eau.

Engrais toute l'année une fois sur deux avec l'engrais ORKIS. Dilution 2 ml/l d'eau.

Après la floraison

- 1 Couper la tige au-dessous des dernières fleurs. Si aucun nouveau bouton ne se développe, ou si la tige a séché, couper la hampe au niveau des feuilles.
- 2 **Continuer les mêmes soins régulièrement.** La plante en pleine forme va produire de nouvelles feuilles et des racines pendant 6 à 10 mois, ce qui correspond à son cycle de croissance complet. Il est préférable de ne pas sortir la plante au jardin pendant l'été car les températures sont souvent trop basses.
- 3 Des feuilles et des racines peuvent apparaître sur l'ancienne tige florale. Elles vont former une nouvelle plante appelée **keiki** qui peut être séparé et planté individuellement dans un nouveau pot lorsqu'il aura formé plusieurs racines.
- 4 **Une baisse de température nocturne d'environ 5°C déclenche une nouvelle floraison. Le développement d'une hampe florale prend au moins 4 mois.**
- 5 N'oubliez pas de repoter la plante avec notre substrat pour orchidées tous les 2 ou 3 ans, dès qu'elle n'est plus stable dans son pot ou que le substrat est décomposé. Utiliser des pots transparents de préférence.

En cours de culture peut survenir...

Chute des boutons floraux : provoquée par un manque de lumière, des courants d'air, un coup de froid, un feu de cheminée à proximité ou des arrosages et soins irréguliers.

Cochenille farineuse : insecte blanc cotonneux sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aérofleurs Spray.

Cochenille à bouclier : pustule brune sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aérofleurs Spray.

Acariens : ponctuations grisâtres sous les feuilles causées par la présence d'araignées rouges. Traiter avec Spornyl et augmenter l'humidité ambiante par vaporisation d'eau sur le feuillage.

Feuilles molles : problème d'arrosage. Vérifier après l'arrosage que toutes les racines soient vertes. Si elles sont brunes, elles ont pourri par excès d'eau. Dans ce cas, le repotage s'impose de suite avec nettoyage et retrait des parties abîmées.

Taches brunes sur feuilles, jaunissement de la feuille : peut être causé par un champignon. Traiter avec un fongicide tel que Gesal Anti-maladie.

Taches circulaires brun-jaune / feuille qui fondent et paraissent huileuses à l'intérieur : attaque bactérienne. Traiter de suite avec Physan à 0.15%.

Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l'orchidée dépérir.

Vous trouverez plus d'informations sur www.orchidarium.ch